


FRYKT  **NEVROSER**

Impulsive forandringer kan defineres som en kroppslig respons på kontinuerlig indre, uløst stress. De som foretok undersøkelsen, la merke til dette hos små barn som hadde utviklet god blære og tarmkontroll, men som mistet dette. Andre eldre barn ble også sengevætere, til stor sjenanse for dem selv og skjenn fra moren. Atter andre slukte maten som dyr.

Alle disse eksemplene viser at indre stress påvirker kroppslige funksjoner. Kanskje det er grunnen til at 80 % av dem som oppsøker allmennpraktiserende leger har psykosomatiske problemer. Altfor ofte behandles bare symptomene, og den utløsende livsstilen fortsetter uten å bli utfordret eller forandret.

**IMPULSIVE
FORANDRINGER**  **PSYKOSOMATISKE
FORSTYRRELSER**

Det ble observert tilbaketrekning hos barna i studien når traumet forbundet med atskillelsen ble en så stort at de trakk seg tilbake fra livets viktigste funksjoner, som å spise, leke, være sammen med andre og lignende. Enkelte barn trakk seg inn i en krok og krøp sammen som en ball, som om de inntok en fosterstilling. Budskapet disse sendte ut var sterk frykt og usikkerhet, noe som resulterte i at de ville trekke seg tilbake til den relativt trygge tilværelsen fosteret har i mors liv.